



Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1. Θεωρία βιβλίο Ο.Ε.Δ.Β. σελίδα 150-151
- A2. Θεωρία βιβλίο Ο.Ε.Δ.Β. σελίδα 70
- A3. Θεωρία βιβλίο Ο.Ε.Δ.Β. σελίδα 22
- A4. α. ΣΩΣΤΟ
β. ΣΩΣΤΟ
γ. ΛΑΘΟΣ
δ. ΣΩΣΤΟ
ε. ΛΑΘΟΣ

ΘΕΜΑ Β

- B1. Η παράγωγος συνάρτηση της f είναι
 $f'(x) = 3x^2 - 2κx$, $x \in \mathbb{R}$
- $f'(-1) = 3 + 2κ$ οπότε
- $f'(1) = 3 - 2κ$
- $f'(-1) = -3f'(1) \Leftrightarrow 3 + 2κ = -3(3 - 2κ) \Leftrightarrow$
- $3 + 2κ = -9 + 6κ \Leftrightarrow 4κ = 12 \Leftrightarrow κ = 3$
- B2. Για $κ=3$ έχουμε $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ και $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $x \in \mathbb{R}$
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = 2$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3x(x-2) > 0 \Leftrightarrow x < 0$ ή $x > 2$

x	−∞	0	2	+∞
$f'(x)$	+	0	−	0
$f(x)$	↗	4	↘	0 ↗

Μονοτονία

Αν $x \in (-\infty, 0]$ η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.

Αν $x \in [0, 2]$ η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα.

Αν $x \in [2, +\infty)$ η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.

Ακρότατα

Στο $x_0=0$ έχουμε τοπικό μέγιστο το $f(0)=4$ και στο $x_0=2$ έχουμε τοπικό ελάχιστο το $f(2)=0$.

B3. Έχουμε:

A' ΤΡΟΠΟΣ

$$\begin{aligned} f(3+h) &= (3+h)^3 - 3(3+h)^2 + 4 \text{ οπότε} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-4}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^3 - 3(3+h)^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2(3+h-3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3+h)^2 = 9 \end{aligned}$$

B' ΤΡΟΠΟΣ

$$f(3) = 3^3 - 3 \cdot 3^2 + 4 = 4 \text{ και } f'(3) = 3 \cdot 3^2 - 6 \cdot 3 = 9.$$

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} = f'(3) = 9$$

Το σημείο επαφής είναι $M(3, 4)$. Η εφαπτομένη στο $M(3, 4)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης ίση με $f'(3) = 9$ και η εξίσωση της είναι $y=9x+\beta$.

Επειδή όμως το σημείο M ανήκει στην ευθεία έχουμε $4 = 9 \cdot 3 + \beta \Leftrightarrow \beta = -23$ Άρα η εξίσωση της εφαπτόμενης είναι $y=9x-23$.

B4.

$$\begin{aligned} \text{Έχουμε } f''(x) &= 6x-6 \\ f''(x) = 0 &\Leftrightarrow 6x-6 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \\ f''(x) > 0 &\Leftrightarrow 6x-6 > 0 \Leftrightarrow x > 1 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$			

Άρα το σημείο στην τετμημένη του οποίου ο ρυθμός μεταβολής της $y=f(x)$ ως προς x έχει την ελάχιστη τιμή είναι το $(1, f'(1))$ δηλαδή $(1, -3)$.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Το μέσον της δεύτερης κλάσης είναι 35 και της τέταρτης 55. Άρα

$$35 + \frac{c}{2} + c + \frac{c}{2} = 55 \Leftrightarrow 2c = 55 - 35 \Leftrightarrow c = 10.$$

Επομένως οι 4 κλάσεις είναι [20,30), [30,40), [40,50) και [50,60).

Γ2. Από το ιστόγραμμα συχνοτήτων έχουμε $v_1 = 12$ και $v_4 = 4$

$$v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 40 \Leftrightarrow v_2 + v_3 = 24 \quad (1)$$

$$\bar{x} = \frac{12 \cdot 25 + 35 \cdot v_2 + 45 \cdot v_3 + 4 \cdot 55}{40} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 300 + 35 \cdot v_2 + 45 \cdot v_3 + 220 = 1440 \Leftrightarrow 35 \cdot v_2 + 45 \cdot v_3 = 920 \quad (2)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2)


$$\begin{cases} v_2 + v_3 = 24 \\ 35v_2 + 45v_3 = 920 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -45v_2 - 45v_3 = -1080 \\ 35v_2 + 45v_3 = 920 \end{cases} \Rightarrow (+)$$

$$35v_2 + 45v_3 = 920$$

$$-10v_2 = -160 \Leftrightarrow v_2 = 16 \text{ οπότε } v_3 = 8.$$

Γ3.

[-)	x_i	v_i	f_i	F_i	$F_i\%$
[20,30)	25	12	0,3	0,3	30
[30,40)	35	16	0,4	0,7	70
[40,50)	45	8	0,2	0,9	90
[50,60)	55	4	0,1	1	100
Σύνολο		40			




Έχουμε $\Gamma(30,30)$, $\Delta(\delta,50)$, $E(40,70)$ και

$$\lambda_{\Gamma\Delta} = \frac{50 - 30}{\delta - 30} = \frac{20}{\delta - 30}$$

$$\lambda_{\Gamma E} = \frac{70 - 30}{40 - 30} = \frac{40}{10} = 4 \text{ οπότε}$$

$$\lambda_{\Gamma \Delta} = \lambda_{\Gamma E} \Leftrightarrow \frac{20}{\delta - 30} = 4 \Leftrightarrow 4\delta = 140 \Leftrightarrow \delta = 35.$$

Γ4. $P(A - B) + P(B - A) = P(A \cup B) - P(A \cap B) =$
 $= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$ (1)



$$\begin{aligned} P(A') \leq 0,25 &\Leftrightarrow 1 - P(A) \leq 0,25 \Leftrightarrow P(A) \geq 0,75 \\ P(B') \leq 0,65 &\Leftrightarrow 1 - P(B) \leq 0,65 \Leftrightarrow P(B) \geq 0,35 \end{aligned} \Rightarrow P(A) + P(B) \geq 1,1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) \geq 1,1 - 2P(A \cap B) \Rightarrow$$

$$\frac{P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)}{2} \geq 0,55 - P(A \cap B) \stackrel{(1)}{\Rightarrow}$$

$$\frac{P(A - B) + P(B - A)}{2} \geq 0,55 - P(A \cap B)$$

ΘΕΜΑ Δ

Έχουμε $CV = \frac{s}{|\bar{x}|} \Leftrightarrow \frac{s}{|\bar{x}|} = 0,25$

Δ1. $f'(x) = 12x^2 - 2(\bar{x} + 2s)x$

Επειδή η εφαπτόμενη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη $x_0=1$ είναι παράλληλη στον x' , \bar{x} έχει συντελεστή διεύθυνσης 0. Οπότε έχουμε

$$f'(1) = 0 \Leftrightarrow 12 - 2(\bar{x} + 2s) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} + 2s = 6 \Leftrightarrow \bar{x} = 6 - 2s$$

$$\frac{s}{|\bar{x}|} = 0,25 \Leftrightarrow \frac{s}{|6 - 2s|} = 0,25 \Leftrightarrow s = 0,25 \cdot |6 - 2s|$$

• $s = 0,25 \cdot (6 - 2s) \Leftrightarrow s = 1,5 - 0,5s \Leftrightarrow s = 1$

Για $s=1$ έχουμε $\bar{x} = 6 - 2 \cdot 1 \Leftrightarrow \bar{x} = 4$. Τότε ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = 4x^3 + (\bar{x} + 2s)x^2 + \frac{503}{0,25} + s = 4x^3 - 6x^2 + 2013.$$

Έχουμε: $f'(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$

x	−∞	0	1	+∞
f'(x)	+	−	+	
f(x)	↗ 2013 ↗	↘ 2011 ↘		

Η f έχει τοπικό μέγιστο το $f(0) = 2013$ και τοπικό ελάχιστο το $f(1) = 2011$.

- $s = -0,25 \cdot (6 - 2s) \Leftrightarrow s = -1,5 + 0,5s \Leftrightarrow s = -3$ απορρίπτεται.

Δ2. Έχουμε $y = x + c$. Τότε

$$\bar{y} = \bar{x} + c = 4 + c \text{ και } s_y = s = 1$$

$$CV \leq 0,1 \Leftrightarrow \frac{s_y}{|\bar{y}|} \leq 0,1 \Leftrightarrow \frac{1}{|4+c|} \leq 0,1 \Leftrightarrow |4+c| \geq 10$$

- $4+c \leq -10 \Leftrightarrow c \leq -14$ απορρίπτεται γιατί $c > 0$.
- $4+c \geq 10 \Leftrightarrow c \geq 6$

Άρα ο μικρότερος θετικός c είναι ο 6.

Δ3. Έχουμε $P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ και $P(B) = \frac{1}{2\delta-5}$

$$\text{Επειδή η κατανομή είναι κανονική τότε } \delta = \bar{x} = 4 \text{ οπότε } P(B) = \frac{1}{2 \cdot 4 - 5} = \frac{1}{3}.$$

i. Εστω $\alpha = P(A \cap B)$ και $\beta = P(A \cup B)$ με $\alpha, \beta \in [0,1]$ τότε

$$P(A \cap B) \cdot P(A \cup B) = \frac{1}{9} \Leftrightarrow \alpha \cdot \beta = \frac{1}{9} \quad (1)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow$$

$$\beta = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \alpha \Leftrightarrow \alpha + \beta = \frac{5}{6} \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow \alpha \left(\frac{5}{6} - \alpha \right) = \frac{1}{9} \Leftrightarrow \frac{5}{6} \cdot \alpha - \alpha^2 = \frac{1}{9} \Leftrightarrow 18\alpha^2 - 15\alpha + 2 = 0$$

$$\text{που έχει ρίζες } \alpha_1 = \frac{2}{3} \text{ και } \alpha_2 = \frac{1}{6}$$

$$\text{Επειδή όμως } A \cap B \subseteq B \Rightarrow P(A \cap B) \leq P(B) \Rightarrow \alpha \leq \frac{1}{3} \text{ οπότε } \alpha = \frac{1}{6}$$

$$\text{δηλαδή } P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

$$(2) \Rightarrow \beta = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} \Rightarrow \beta = \frac{2}{3} \text{ δηλαδή } P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$


Έχουμε

$$P(A \cup B') = P(A) + P(B') - P(A \cap B') =$$

$$= P(A) + 1 - P(B) - P(A) + P(A \cap B) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \text{ δηλαδή}$$

$$\boxed{P(A \cup B') = \frac{5}{6}}$$

- iii. Επειδή η κατανομή είναι κανονική ή περίπου κανονική με $\bar{x} = 4$, $s = 1$ και $\bar{x} - 2s = 2$ έχουμε:



Το ποσοστό των παρατηρήσεων x_i , με $x_i \leq 2$ είναι $\frac{100 - 95}{2} = 2,5\%$. Τότε το μέγεθος του δείγματος είναι $n = \frac{100}{2,5} = 200$.