

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Φλ1(α)

ΤΑΞΗ: Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

Ημερομηνία: Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1. β
A2. β
A3. α
A4. γ
A5. α. ΛΑΘΟΣ
β. ΣΩΣΤΟ
γ. ΣΩΣΤΟ
δ. ΛΑΘΟΣ
ε. ΣΩΣΤΟ



ΘΕΜΑ Β

- B1. Όταν αφήνουμε τη σφαίρα στη Γή έχουμε:

$$h = \frac{1}{2} g_R t_1^2 \quad (1)$$

Όταν αφήνουμε τη σφαίρα στην Σελήνη έχουμε:

$$h = \frac{1}{2} g_\Sigma t_2^2 \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:

$$\frac{1}{2} g_R t_1^2 = \frac{1}{2} g_\Sigma t_2^2$$

$$g_R t_1^2 = g_\Sigma (\sqrt{6} t_1)^2$$

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022
Β' ΦΑΣΗ


E_3.Φλ1(α)

$$g_F t_1^2 = g_\Sigma 6t_1^2$$

$$g_\Sigma = \frac{g_F}{6}$$

Άρα σωστή επιλογή (β)

B2. Το σώμα Α ισορροπεί:



Με την κατάργηση της F_1 το σώμα Α επιταχύνεται προς τα αριστερά με επιτάχυνση μέτρου $a_1 = \frac{F_2 - F_3}{m} = \frac{F_1}{m}$ (2)

Το σώμα Β αποκτά επιτάχυνση προς τα δεξιά μέτρου $a_2 = \frac{F_1}{2m}$ (3)

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (2) και (3) έχουμε:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{\frac{F_1}{m}}{\frac{F_1}{2m}} = 2$$

Επομένως $a_1 = 2a_2$ ή $a_2 = \frac{a_1}{2}$

Σωστή επιλογή (β)

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Από τον 2^o νόμο του Newton έχουμε

$$F_{OA} = ma$$

$$F - W = ma$$

$$F - mg = ma$$

$$a = 10 \frac{m}{s^2}$$

Γ2. Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Από την εξίσωση της ταχύτητας έχουμε: $v_1 = v_0 + a\Delta t$

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Φλ1(a)

$$\Delta t = \frac{v_1}{a}$$

$$t_1 = 1s$$


Για την κατακόρυφη μετατόπιση του στον ίδιο χρόνο έχουμε:

$$y = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$$


$$y = 5m$$

Γ3. Όταν καταργείται η δύναμη F , η μοναδική δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι η βαρυτική, με αποτέλεσμα να αρχίσει να επιβραδύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου $\alpha' = g = 10 \frac{m}{s^2}$.

Το σώμα θα ακινητοποιηθεί μετά από χρόνο $\Delta t'$ από την κατάργηση της δύναμης F



Το διάγραμμα που περιγράφει το πώς μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας σε σχέση με τον χρόνο :



Από το εμβαδό του διαγράμματος υπολογίζουμε τη συνολική κατακόρυφη μετατόπιση, επομένως και το μέγιστο ύψος που θα φτάσει το σώμα.

$$h_{max} = 10m$$


Γ4. Για τον υπολογισμό του λόγου της κινητικής με την βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος, πριν τη κατάργηση της δύναμης F έχουμε:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Φλ1(a)

$$\frac{K}{U} = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{\frac{1}{2}mgy} = \frac{\frac{1}{2}(at)^2}{g\frac{1}{2}at^2} = \frac{a^2t^2}{gat^2} = \frac{a}{g} = 1$$

ΘΕΜΑ Δ



Δ1. Τα νήματα είναι αβαρή και μη εκτατά άρα $T_{v2} = T_{v2}'$.

Το σώμα Β ισορροπεί άρα: $F_{OA.Bx} = 0$

$$T_{v2}' - w_{2x} = 0$$

$$T_{v2}' = w_{2x}$$

$$T_{v2}' = m_2 g \eta \mu \varphi$$

$$T_{v2}' = 10N$$

Το σώμα Α ισορροπεί άρα: $F_{OA.Ax} = 0$

$$T_{v1} - w_{1x} - T_{v2} = 0$$

$$T_{v1} = w_{1x} + T_{v2}$$

$$T_{v1} = m_1 g \eta \mu \varphi + T_{v2}$$

$$T_{v1} = 15N$$

Δ2. Εφαρμόζω θεώρημα έργου – ενέργειας για το σώμα Β από την αρχική του θέση μέχρι την βάση του κεκλιμένου επιπέδου.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Φλ1(a)

$$\Delta K = \Sigma W_F$$


$$K_{TEA} - K_{APX} = W_w + W_N$$

$$\frac{1}{2} m_2 v_2^2 - 0 = m_2 g h_2$$

$$v_2 = \sqrt{2gh_2}$$

$$v_2 = 15 \frac{m}{s}$$

Δ3.



Κατά την ολίσθηση του σώματος Β στο οριζόντιο τραχύ δάπεδο, δέχεται από αυτό μία δύναμη, την $F_{\delta\alpha\pi\epsilon\delta\omega}$ η οποία αναλύεται σε δύο κάθετες συνιστώσες:

- Την κάθετη αντίδραση N_2
- Την δύναμη της τριβής ολίσθησης T

Στον κατακόρυφο άξονα το σώμα ισορροπεί.

$$F_{O\Lambda.\Psi} = 0$$

$$N_2 - w_2 = 0$$

$$N_2 = w_2$$

$$N_2 = 20N$$

Η τριβή ολίσθησης έχει μέτρο $T = \mu N = 15N$

Άρα το μέτρο της $F_{\delta\alpha\pi\epsilon\delta\omega}$ θα υπολογιστεί από τον κανόνα του παρ/μου:

$$F_{\delta\alpha\pi\epsilon\delta\omega} = \sqrt{N_2^2 + T^2} = \sqrt{625} = 25N.$$

Δ4. Α τρόπος: Το σώμα Β ολισθαίνει και ακινητοποιείται στο οριζόντιο τραχύ δάπεδο. Άρα η θερμική ενέργεια που εκλύθηκε θα ισούται με την αρχική μηχανική ενέργεια του σώματος. Επομένως

$$Q = E_{M_{HX.APX.}} = K_{APX} + U_{APX.} = 0 + m_2 g h_2 = 225J$$

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022

Β' ΦΑΣΗ

E 3.Φλ1(α)

Β τρόπος: Η θερμική ενέργεια που εκλύεται ισούται αριθμητικά με το έργο της τριβής κατά την είσοδο του σώματος Β στο οριζόντιο τραχύ επίπεδο μέχρι να ακινητοποιηθεί. Επομένως:

$$\text{Θεώρημα} \quad \text{'Εργου} \quad - \quad \text{Ενέργειας:} \\ \Delta K = \Sigma W_F$$

$$K_{TEA} - K_{APX} = W_w + W_N + W_T$$

$$0 - \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = 0 + 0 + W_T$$

$$W_{T\equiv} - 225J$$

$$\text{App } Q = |W_T| = 225J$$

Δ5. Η ισχύς της τριβής ολίσθησης δίνεται από την σχέση $P_T = -T\nu$ όπου ν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος εκείνη τη χρονική στιγμή.

Η κινητική ενέργεια του σώματος έκεινη τη χρονική στιγμή θα είναι υποτετραπλάσια της κινητικής ενέργειας που είχε κατά την είσοδο στο οριζόντιο τραχύ επίπεδο.

$$K_{TEA.} = \frac{1}{4} K_{APX.}$$

$$\text{Ap\alpha } P_T = -T\nu = -15 \cdot 7,5 = -112,5 \text{ Watt}$$