

ΤΑΞΗ:

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΧΗΜΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ





Ημερομηνία: Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ





ΘΕΜΑ Α

A1. Ο γενικός μοριακός τύπος των ακόρεστων υδρογονανθράκων με δύο διπλούς δεσμούς είναι:



Μονάδες 5

A2. Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις δεν είναι αντίδραση προσθήκης;



Μονάδες 5

A3. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις είναι ακόρεστη;



Μονάδες 5

- A4.** Το προϊόν ή προϊόντα της αντίδρασης του 1-βουτενίου με νερό, παρουσία H_2SO_4 είναι:
- α. Η 1-βουτανόλη.
 - β. Η 2-βουτανόλη.
 - γ. Ισομοριακό μίγμα 1-βουτανόλης και 2-βουτανόλης.
 - δ. Μίγμα 1-βουτανόλης και 2-βουτανόλης με μεγαλύτερη αναλογία σε 2-βουτανόλη.

Μονάδες 5

- A5.** Δύο ή περισσότερες οργανικές ενώσεις παρουσιάζουν το φαινόμενο της συντακτικής ισομέρειας, όταν έχουν:
- α. Διαφορετικό μοριακό τύπο αλλά τον ίδιο συντακτικό τύπο.
 - β. Διαφορετικό συντακτικό τύπο αλλά τον ίδιο μοριακό τύπο.
 - γ. Τον ίδιο συντακτικό τύπο αλλά διαφορετικές ιδιότητες.
 - δ. Την ίδια σχετική μοριακή μάζα.

Μονάδες 5**ΘΕΜΑ Β**

- B1.** Να συμπληρώσετε τα προϊόντα στις επόμενες χημικές εξισώσεις:
- α. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ (κύριο προϊόν)
 - β. $\text{HC}\equiv\text{CH} + \text{Na}$ (περίσσεια) $\rightarrow$
 - γ. Πλήρης καύση του δεύτερου μέλους των αλκενίων.
 - δ. Πολυμερισμός $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$.
 - ε. Πλήρης καύση $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ με περίσσεια $\text{O}_2 \rightarrow$
 - στ. Προσθήκη ισομοριακής ποσότητας H_2 σε αιθίνιο, και προσθήκη H_2O στο προϊόν αυτού.

Μονάδες 7

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2024
Α' ΦΑΣΗ

E_3.Xλ2Γ(ε)

B2. Να αντιστοιχίσετε κάθε οργανική ένωση της στήλης (I) με τον μοριακό τύπο που της αντιστοιχεί στη στήλη (II).

Στήλη I	Στήλη II
1) 2-μέθυλο-1-πεντένιο	A. $C_6H_{12}O$
2) 1-βουτίνιο	B. C_6H_{12}
3) εξανάλη	Γ. C_4H_6
4) 1-προπανόλη	Δ. C_6H_{14}
5) 2,2-διμεθυλοβουτάνιο	E. C_3H_8O

Μονάδες 5

B3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:

- Για κάθε αλκίνιο υπάρχει κι ένα αλκαδιένιο με τον ίδιο μοριακό τύπο.
- Προσθήκη νερού σε αλκίνιο δίνει ως τελικό προϊόν καρβονυλική ένωση.
- Τα αλκάνια και οι κορεσμένες μονοσθενείς αλδεΐδες δεν παρουσιάζουν ισομέρεια θέσης.
- Στην αντίδραση προσθήκης HBr στο 2-βουτένιο δεν ισχύει ο κανόνας του Markovnikov.
- Το φυσικό αέριο έχει ως κύριο συστατικό το μεθάνιο.

Μονάδες 5

B4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:

- Η βενζίνη είναι το σημαντικότερο κλάσμα της διύλισης του πετρελαίου. Από χημική σκοπιά η βενζίνη είναι μίγμα υδρογονανθράκων με έως άτομα άνθρακα στο μόριό τους.
- Με του αιθενίου σε κατάλληλες συνθήκες παράγεται το πολυαιθένιο.

- γ. Με προσθήκη περίσσειας HI σε $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ παράγεται ως κύριο προϊόν.
- δ. Με προσθήκη HCl στο αλκένιο με συντακτικό τύπο προκύπτει ως μοναδικό προϊόν το 2-χλωροβουτάνιο.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ


Γ1. Αλκένιο (M) μάζας 5,6 g καταλαμβάνει όγκο 2,24 L σε STP.

- α. Να αποδείξετε ότι ο μοριακός τύπος του αλκενίου (M) είναι C_4H_8 και να βρείτε τα συντακτικά του ισομερή.
- β. Να υπολογιστεί ο όγκος του αερίου HBr (σε L και STP) που απαιτείται για την πλήρη αντίδραση 0,5 mol του αλκενίου M.
- γ. 0,4 mol του αλκενίου M καίγονται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα O_2 . Να υπολογίσετε τη μάζα του CO_2 που παράγεται και τον όγκο των υδρατμών σε STP.


Δίνονται: $A_r \text{ C} = 12, A_r \text{ H} = 1, A_r \text{ O} = 16$.

Μονάδες 5+2+3=10

Γ2. Δίνονται τα δύο παρακάτω διαγράμματα αντιδράσεων:



Διάγραμμα 1



Διάγραμμα 2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2024
Α' ΦΑΣΗ**E_3.Xλ2Γ(ε)**

- α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους (κύρια προϊόντα) των ενώσεων Β, Γ, Δ, και Ε του διαγράμματος 1.

Μονάδες 4

- β. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους (κύρια προϊόντα) των ενώσεων Ζ, Θ, Κ, Λ, του διαγράμματος 2, αν είναι γνωστό ότι η ένωση Κ είναι κορεσμένη μονοσθενής αλδεϋδη.

Μονάδες 4**Γ3.**

- α. 5,4 g αλκινίου με 4 άτομα άνθρακα αντιδρούν πλήρως με Na.
i. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του αλκινίου.
ii. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου που παράγεται σε STP.


Δίνονται: $A_r \text{ C} = 12, A_r \text{ H} = 1$.

Μονάδες 2+2 = 4

- β. Αέριο αλκίνιο παράγει κατά την πλήρη καύση του τριπλάσιο όγκο CO_2 . Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του αλκινίου. Δίνεται ότι οι όγκοι των αερίων μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

Μονάδες 3**ΘΕΜΑ Δ**

- Δ1.** Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου $V = 41 \text{ L}$ και σε σταθερή θερμοκρασία 227°C , τοποθετούνται 5 mol NO και 64 g O_2 , τα οποία σε κατάλληλες συνθήκες αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση



- α. Να υπολογίσετε τη σύσταση σε mol στο δοχείο στο τέλος της αντίδρασης.

Μονάδες 4

- β. Να βρείτε την πίεση που ασκείται στο δοχείο στο τέλος της αντίδρασης.

Μονάδες 3

Δίνονται: $A_r \text{ O} = 16, R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol}$.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2024
Α' ΦΑΣΗ**E_3.Xλ2Γ(ε)**

- Δ2.** Ισομοριακό μίγμα αλκανίου (A) και αλκενίου (B), με τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα, διέρχεται από διάλυμα Br_2 (σε CCl_4). Η αύξηση μάζας του διαλύματος είναι 2,8 g, ενώ μετά την διέλευση από το διάλυμα Br_2 ο όγκος του αερίου που διαφεύγει είναι 2,24 L σε STP.

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των δύο υδρογονανθράκων (A) και (B).

Δίνονται: $A_r \text{ C} = 12$, $A_r \text{ H} = 1$.

Μονάδες 7

- Δ3.** Μίγμα των υδρογονανθράκων CH_4 και C_4H_8 , μάζας 8,8 g, καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα (20% v/v O_2 , 80% v/v N_2) και τα προϊόντα της καύσης, μετά την ψύξη τους, διοχετεύονται σε διάλυμα NaOH . Το αρχικό μίγμα για πλήρη υδρογόνωση απαιτεί 2,24 L υδρογόνου σε STP συνθήκες παρουσία νικελίου.

α. Ποια θα είναι η αύξηση μάζας του διαλύματος NaOH ;

β. Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα που απαιτείται για την καύση σε STP.

Δίνονται: $A_r \text{ C} = 12$, $A_r \text{ H} = 1$, $A_r \text{ O} = 16$.

Μονάδες 7+4**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!**